	Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
	U.O.C. Prevenzione e Sorveglianza Malattie Infettive e Cronico Degenerative U.O.C. Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita
Sedi: Viale Colombo, 106 - 60127 Ancona Via Po, 11 - 60019 Senigallia (AN) Via Guerri, 9-11 - 60035 Jesi (AN) Via Turati, 51 - 60044 Fabriano (AN)	
PEC: <a href="mailto:areavasta2.asur@emarche.it">areavasta2.asur@emarche.it</a>	

Ancona, 12/09/2022

Prot. n. 156340

Al Sindaco del Comune di Osimo (AN)  
Via PEC: [comune.osimo@emarche.it](mailto:comune.osimo@emarche.it)

**Oggetto: Informazione nei confronti di persone esposte a rischio documentato di trasmissione di USUV**

Ad integrazione della comunicazione prot n. 153291 del 08/09/2022 (Positività al Virus Usutu nel comune di Osimo), visto quanto riportato nel Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu e nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025, nei territori nei quali viene evidenziata circolazione virale o dove è stata dimostrata la presenza di zanzare infette, va potenziata l'informazione affinché le persone che vivono o lavorano in quei territori adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di essere punte e per permettere una diagnosi tempestiva di eventuali casi clinici.

Di seguito le raccomandazioni generali per la prevenzione delle punture di insetti previste nel Piano Nazionale Integrato, da diffondere alla popolazione mediante le modalità che la S.V. riterrà più opportune:

*"Per ridurre il rischio di trasmissione di WNV e USUV, la misura preventiva più efficace è quella di evitare la puntura di zanzare. In particolare l'approccio alla prevenzione è influenzato dal livello di concentrazione dei vettori e, quindi, in alcuni casi, può essere necessario adottare più misure di prevenzione, quali:*

- *all'aperto, utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico; è necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento;*
- *all'aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);*
- *alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre ed alle porte d'ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;*




- nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi."

Si rimanda alla S.V. la valutazione dell'applicazione di "un intervento mirato di disinfestazione con adulticidi in particolari siti ritenuti sensibili, come ospedali, strutture residenziali protette, aree ricreative, parchi pubblici ecc., oppure in occasione di eventi sociali all'aperto, quali fiere o sagre, che si svolgano tra il crepuscolo e la notte"

Cordiali saluti.

Il Direttore  
U.O.C. Prevenzione e Sorveglianza Malattie  
Infettive e Cronico Degenerative  
Dott. Daniela Cimini



P. Il Direttore f.f. U.O.C.  
Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita  
Dott. Massimiliano Cannas

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE  
ASUR VAETA  
Dipartimento di Prevenzione  
U.O.C. Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita  
Dott. Alberto Lino Masiero

